	STANDARD POSTĘPOWANIA - ZAŁ. DO KZ17		SOP DGP- 1/2013	
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO			Strona 1/3
	Obowiązuje : Oddział Ginekologiczno-Położniczy		DATA 01.10.2018	WYDANIE 6

1. Cel

Celem standardu jest określenie zasad stosowania antybiotyków w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu

2. Opis procesu

2.1 Odpowiedzialność.

DM – odpowiada za ogólny nadzór nad standardem.

DGP – odpowiada za merytoryczne przygotowanie i opracowanie standardu.

PZJ – odpowiada za zgodność standardu z ZSZ


KKO – odpowiada za przestrzeganie i stosowanie przez pracowników danego oddziału standardu oraz aktualizację listy antybiotyków w profilaktyce okołozabiegowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i wytycznymi towarzystw naukowych.

Pracownicy KO odpowiadają za zapoznanie się i przestrzeganie w pracy zapisów standardu.

2.2 Przebieg procesu

- Podstawowy antybiotyk Cefazolina w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów Oddziału Ginekologiczno-Położniczego jest podawany na bloku operacyjnym do 30 minut przed nacięciem powłok skórnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną po zleceniu dawki i rodzaju antybiotyku w karcie lekowej pacjenta przez anestezjologa prowadzącego znieczulenie podczas operacji.
- Antybiotyk w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów Oddziału Ginekologiczno-Położniczego jest podawany na bloku operacyjnym do 30 minut przed nacięciem powłok skórnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną **na podstawie zlecenia przez lekarza KO dawki i rodzaju antybiotyku w karcie zleceń lekarskich.**
- Decyzja o rodzaju antybiotyku i dawce w profilaktyce okołozabiegowej jest podejmowana przez lekarza prowadzącego, KKO lub dyżurnego z danej KO i wpisywana do planu zabiegów oraz karty zleceń lekarskich przed konsultacją anestezjologiczną z adnotacją „podanie na bloku”. **Fakt podania antybiotyku lekarz anestezjolog odnotowuje w karcie przebiegu znieczulenia, a pielęgniarka anestezjologiczna w karcie zleceń pacjenta.**
- Główny operator zabiegu, informuje anestezjologa o przedłużeniu się operacji i konieczności podania kolejnej dawki antybiotyku śródoperacyjnie.
- W przedłużających się zabiegach kolejna dawka antybiotyku powinna być podana po 4-ch godzinach i wynosi 1,0 g Cefazoliny dożylnie niezależnie od masy ciała pacjenta.
- Antybiotyki stosowane na bloku operacyjnym w profilaktyce okołozabiegowej są na stanie anestezjologicznej apteczki bloku operacyjnego.

Stosowanie antybiotyków na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w profilaktyce okołoperacyjnej w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego:

	STANDARD POSTĘPOWANIA - ZAŁ. DO KZ17		SOP DGP- 1/2013	
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO			Strona 2/3
	Obowiązuje :Oddział Ginekologiczno-Położniczy		DATA 01.10.2018	WYDANIE 6

Laparotomia (adnexectomia, histerektomia)

Cefazolina 2,0 g dożylnie - do 30 minut przed nacięciem powłok skórnych jednorazowo. W przypadku uczule-
nia na antybiotyki beta-laktamowe podawana jest :Gentamycyna 160 mg dożylnie + Metronidazol 500 mg do-
żylnie - do 30 min przed nacięciem powłok skórnych jednorazowo.

Laparoskopia, Histeroskopia – bez profilaktyki.

Abrazja (zabiegi w krótkim znieczuleniu) – bez profilaktyki.

Cięcie cesarskie;

Cefazolina 2,0 g dożylnie do 30 minut przed nacięciem powłok skórnych jednorazowo.

3. Terminologia i skróty

KO – Komórka organizacyjna Szpitala.


KKO – Kierownik KO

4. Dokumenty związane

- Standard Postępowania KZ -17 „ Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa” – wydanie 5
- Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołoperacyjnej– Rekomendacje zalecane przez Prof. dr hab. med. Walerię Hryniewicz, Prof. dr hab. med. Jana Kuliga (2011)
- Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.
- Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów do-
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

5. Załączniki

Brak

	STANDARD POSTĘPOWANIA - ZAŁ. DO KZ17	SOP DGP- 1/2013
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO	
	Obowiązuje : Oddział Ginekologiczno-Położniczy	DATA 01.10.2018

6. Spis treści, Karta zmian, Zatwierdzenia

Spis treści

1. Cel.....	str 1
2. Opis procesu	str 1
3. Terminologia i skróty.....	str 2
4. Dokumenty związane	str 2
5. Załączniki	str 2
6. Spis treści, Karta zmian, Zatwierdzenia	str 3

Karta zmian

Nr zmiany	Zmiany		Opis zmiany	Data zmiany	Podpis autora zmiany
	Punktu Podpunktu rozdziału	Akapitu lub fragmentu tekstu ze strony nr			
1	2.2	1	Zniesiono stosowanie Ampicyliny w profilaktyce cięcia cesarskiego	14.03.2014	Dariusz Kujawski
2	Całość	Całość	Przegląd aktualizacyjny	10.02.2014	Dariusz Kujawski
3	2.2	1	Zniesiono stosowanie Cefazoliny 4 godz. po cięciu cesarskim	24.09.2014	Dariusz Kujawski
4	2.2	1	Nowa treść	08.05.2015	T. Lubszczyk
5	2.2	1	Nowa treść	26.06.2015	W. Kącik
6	Całość	Całość	Zmiana szaty graficznej – wydanie 6	01.10.2018	Beata Mros-Jaszewska

Zatwierdzenia

Zespół	Imię i nazwisko KO	Data	Podpis
Opracował	DGP Dariusz Kujawski	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	DOZ Teresa Lubszczyk	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	NEp Beata Mros-Jaszewska	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	NEp Barbara Matuszek	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdził	PZJ Grzegorz Bula	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Zatwierdziła	DM Elżbieta Wielgos-Karpińska	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>