	STANDARD POSTĘPOWANIA –ZAŁ. DO KZ 17	NR -1-DO-2013
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO	
	Obowiązuje : oddział okulistyczny	DATA: 01.10.2018

1.Cel

Celem procedury jest stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołozabiegowej, w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu u pacjentów Oddziału Okulistycznego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

2. Opis procesu

2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KKO – odpowiada za zatwierdzenie i wdrożenie przez pracowników oddziału procedury.


Pracownicy oddziału odpowiadają za zapoznanie się i przestrzeganie w pracy zapisów procedury.

2.2. PRZEBIEG PROCESU

Stosowanie antybiotyków na Oddziale Okulistycznym w profilaktyce okołoperacyjnej w zależności od rodzaju zabiegu

Lp. RODZAJ ZABIEGU

- | | |
|--|---|
| <p>1. Operacja zaćmy
Tryb planowy</p> | <p>Miejscowo: Aminoglikozydy (krople okulistyczne Sol. 0,3% Gentamycyna) lub fluorochinolony (najlepiej III lub IV generacji) lub preparat złożony z polimyksyny B, bacytracyny i neomycyny- podawane do worka spojówkowego przedoperacyjnie 3 -5x dziennie 1-2 krople, na 1-2 dni przed zabiegiem oraz w dniu zabiegu w ciągu 1 godz. przed zabiegiem 1-2 krople 3x co 15 min. Śródoperacyjnie – 1mg cefuroksymu w 0,1ml 0,9% soli fizj. dokomorowo lub iniekcja podspojówkowa - w dawce 0,5 ml Gentamycyny (20mg z amp 80mg) + 1,0 mg Dexavenu podawana bezpośrednio po zabiegu operacyjnym zaćmy na stole operacyjnym. Pooperacyjnie - fluorochinolony (j/w) lub preparat złożony j.w. zaraz po zabiegu i kolejne 2 razy w odstępie 5 minut, następnie 3-5x dziennie 1-2 krople, przez kolejne 7-14 dni</p> |
| <p>2. Operacja jaskry
Tryb planowy</p> | <p>Miejscowo: Aminoglikozydy (krople okulistyczne Sol. 0,3% Gentamycyna) lub fluorochinolony (najlepiej III lub IV generacji) podawane miejscowo do worka spojówkowego 3-5 x dziennie 1-2 krople w dzień przedoperacyjny oraz w ciągu 1 godz. przed zabiegiem 1-2 krople 3x co 15 min. , Iniekcja podspojówkowa - w dawce 0,5 ml Gentamycyny (20mg z amp 80mg) + 1,0mg Dexawenu podawana bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, na stole operacyjnym. Pooperacyjnie: aminoglikozydy lub fluorochinolony (j/w) podawane miejscowo do worka spojówkowego 3-5x dziennie 1-2 krople przez kolejne 7-14 dni</p> |
| <p>3. Iniekcja doszklistkowa
Tryb planowy</p> | <p>Miejscowo: fluorochinolony (najlepiej III lub IV generacji) podawane 3 – 5x dziennie 1-2 krople miejscowo do worka spojówkowego na 3-5 dni przed iniekcją oraz w dniu zabiegu w ciągu 1 godz. przed zabiegiem 1-2 krople 3x co 15 min., bezpośrednio po zabiegu leki j/w 3x co 5'. Pooperacyjnie: fluorochinolony (najlepiej III lub IV generacji) 3-5x dziennie miejscowo do worka spojówkowego przez kolejne 7 dni.</p> |

	STANDARD POSTĘPOWANIA –ZAŁ. DO KZ 17		NR -1-DO-2013
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO		Strona 2/3
	Obowiązuje : oddział okulistyyczny	DATA: 01.10.2018	WYDANIE 5

3. Terminologia i skróty

KO – Komórka organizacyjna Szpitala.

KKO – Kierownik KO


4. Dokumenty związane

Z niniejszą procedurą związane są następujące dokumenty:

1. Standard postępowania KZ17 –„Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa” – **wydanie 5**
2. Piśmiennictwo: „Chirurgia Okulistyczna” George L. Spaeth Wrocław 2006r.,
3. „Postępowanie okołoperacyjne w chirurgii zaćmy” Wytyczne PTO Polskie Towarzystwo Okulistyczne – 10.06.2014r.,
4. „Chirurgia soczewki” prof. Dr hab. Józef Kałużny .
5. L. Cordoves, S. Gardner, and oth., “Endophthalmitis following cataract surgery” ESCRS Londyn, 2014
6. CiullaTA., Starr MB., Masket S.: Bacterial endophthalmitis prophylaxis for cataract surgery: an evidence-based update, Ophthalmology 2002
7. Jenssen MK, and others: Third- and fourth-generation fluoroquinolones: retrospective comparison of endophthalmitis after cataract surgery performed 304 after 10 years. J Cataract Refract Surg 2008

5. Załączniki

Brak

	STANDARD POSTĘPOWANIA –ZAŁ. DO KZ 17	NR -1-DO-2013
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO	Strona 3/3
	Obowiązuje : oddział okulistyczny	DATA: 01.10.2018

6. Spis treści, Karta zmian, Zatwierdzenia.

Spis treści


1. Cel.....	str 1
2. Opis procesu	str 1
3. Terminologia i skróty	str 2
4. Dokumenty związane	str 2
5. Załączniki	str 2
6. Spis treści, Karta zmian, Zatwierdzenia	str 3

Karta zmian

Nr zmiany	Zmiany		Opis zmiany	Data zmiany	Podpis autora zmiany
	Punktu Podpunktu rozdziału	Akapitu lub fragmentu tekstu ze strony nr			
1	Całość	Całość	Zmiana formy graficznej dopisanie antybiotyku w iniekcji podspójówkowej.	13.09.2013	K. Kamińska
2	Całość	Całość	Przegląd, aktualizacja	10.02.2014	J. Krowicka
3	Całość	Całość	Aktualizacja	01.12.2014	J. Krowicka
4	Całość	Całość	Zmiana szaty graficznej – wydanie 5	01.10.2018	Beata Mros-Jaszewska

Zatwierdzenia

Zespół	Imię i nazwisko KO	Data	Podpis
Opracowała	DO Jolanta Łogiewa–Toborek	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	DOZ Teresa Lubarczyk	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	NEp Beata Mros-Jaszewska	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	NEp Barbara Matuszek	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdził	PZJ Grzegorz Bula	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Zatwierdziła	DM Elżbieta Wielgos-Karpińska	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>

	STANDARD POSTĘPOWANIA –ZAŁ. DO KZ 17		NR -1-DO-2013
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO		Strona 4/3
	Obowiązuje : oddział okulistyczny	DATA: 01.10.2018	WYDANIE 5