

	STANDARD POSTĘPOWANIA - ZAŁ. DO KZ17		SOP DOT- 5/2013	
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII			Strona 1/3
	Obowiązuje : ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII		DATA 01.10.2018	WYDANIE 5

1. Cel

Celem niniejszego standardu jest określenie zasad stosowania antybiotyków w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu.

2. Opis procesu

2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DM – odpowiada za ogólny nadzór nad standardem.

Dot – odpowiada za merytoryczne przygotowanie i opracowanie standardu.

PZJ – odpowiada za zgodność standardu z ZSZ

KKO – odpowiadają za przestrzeganie i stosowanie przez pracowników danego oddziału standardu oraz aktualizację listy antybiotyków w profilaktyce okołozabiegowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i wytycznymi towarzystw naukowych.

Pracownicy KO odpowiadają za zapoznanie się i przestrzeganie w pracy zapisów standardu.

2.2. PRZEBIEG PROCESU

2.2.1. Szczegółowy przebieg:

- Podstawowy antybiotyk Cefazolina w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów Oddziału Otolaryngologii jest podawany na bloku operacyjnym do 30 minut przed nacięciem powłok skórnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną po zleceniu dawki i rodzaju antybiotyku w karcie lekowej (znieczulenia) pacjenta przez anestezjologa prowadzącego znieczulenie podczas operacji.
- Antybiotyk w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów Oddziału Otolaryngologii jest podawany na bloku operacyjnym do 30 minut przed nacięciem powłok skórnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną **na podstawie zlecenia przez lekarza KO dawki i rodzaju antybiotyku w karcie zleceń lekarskich.**
- Decyzja o rodzaju antybiotyku i dawce w profilaktyce okołozabiegowej jest podejmowana przez lekarza prowadzącego, KKO lub dyżurnego z danej KO i wpisywana do planu zabiegów oraz karty zleceń lekarskich przed konsultacją anestezjologiczną z adnotacją „podanie na bloku”. **Fakt podania antybiotyku lekarz anestezjolog odnotowuje w karcie przebiegu znieczulenia, a pielęgniarka anestezjologiczna w karcie zleceń pacjenta.**
- Główny operator zabiegu, informuje anestezjologa o przedłużeniu się operacji i konieczności podania kolejnej dawki antybiotyku śródoperacyjnie.
- W przedłużających się zabiegach kolejna dawka antybiotyku powinna być podana po 4-ch godzinach i wynosi 1,0 g Cefazoliny dożylnie niezależnie od masy ciała pacjenta.
- Antybiotyki stosowane na bloku operacyjnym w profilaktyce okołozabiegowej są na stanie anestezjologicznej apteczki bloku operacyjnego.

2.2.2 Stosowanie antybiotyków na Oddziale Otolaryngologicznym w profilaktyce okołoperacyjnej w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego:

a) operacja usunięcia migdałków podniebiennych – rana czysta-skażona – wskazane stosowanie antybiotyku

	STANDARD POSTĘPOWANIA - ZAŁ. DO KZ17		SOP DOT- 5/2013
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII		Strona 2/3
	Obowiązuje :ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII		DATA 01.10.2018

w systemie profilaktyki okołoperacyjnej jak w punkcie 2.2.1, a następnie zgodnie z decyzją lekarza operującego, w zależności od stanu miejscowego w trakcie operacji.

b) operacje w zakresie nosa oraz zatok przynosowych – rana czysta-skażona – wskazana profilaktyka przy użyciu Cefazoliny w dawce 1 g (przy wadze do 80 kg) dożylnie do 30 minut przed planowanym nacięciem chirurgicznym lub Cefazoliny w dawce 2 g (przy wadze powyżej 80 kg) dożylnie do 30 minut przed planowanym nacięciem chirurgicznym.

c) operacje w obrębie ucha – rana czysta – profilaktyka tylko przy uzasadnionym podejrzeniu toczącego się procesu zapalnego na tle bakteryjnym /Cefazoliny- jw./, w pozostałych przypadkach bez profilaktyki.

d) operacje w obrębie głowy i szyi;

- rana czysta – bez cech zakażenia bakteryjnego, bez ingerencji w drogi oddechowe i pokarmowe – profilaktyka nie stosowana,

- rana czysta nowotworowa – rozważenie profilaktyki antybiotykowej w zależności od rozległości i stopnia naciekania procesu npl.

- rana czysta-skażona, skażona – z ingerencją w drogi oddechową i pokarmową – wskazanie profilaktyki antybiotykowej skojarzonej, działającej na bakterie tlenowe i beztlenowe – Cefazoliny w dawce 1 g dożylnie (przy wadze do 80 kg) lub Cefazoliny 2,0 g (waga powyżej 80kg) dożylnie do 30 minut przed planowanym nacięciem powłok skórnych plus Metronidazol w dawce 500 mg (100 ml) dożylnie – kontynuacja po zabiegu w razie konieczności.

e) W przedłużających się zabiegach kolejna dawka antybiotyku powinna być podana po 4 godz. i wynosi 1,0g Cefazoliny dożylnie (niezależnie od wagi)

f) W przypadku uczulenia na w/w antybiotyk stosujemy Klindamycynę dożylnie w dawce 600 – 900 mg 30 minut przed nacięciem powłok skórnych.

3. Terminologia i skróty

KO – Komórka organizacyjna Szpitala.

KKO – Kierownik KO

4. Dokumenty związane

Z niniejszą procedurą związane są następujące dokumenty:

- Standard Postępowania KZ -17 „Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa” -wydanie 4.
- Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołoperacyjnej – Rekomendacje zalecane przez Prof. dr hab. med. Walerię Hryniewicz, Prof. dr hab. med. Jana Kuliga (2011)
- Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 15 grudnia 1996r.
- Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

5. Załączniki

Brak

	STANDARD POSTĘPOWANIA - ZAŁ. DO KZ17		SOP DOt- 5/2013	
	STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE OKOŁOZABIEGOWEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII			Strona 3/3
	Obowiązuje :ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII		DATA 01.10.2018	WYDANIE 5

6. Spis treści, Karta zmian, Zatwierdzenia.

Spis treści

1. Cel.....	str 1
2. Opis procesu ...	str 1-2
3. Terminologia i skróty.....	str 2
4. Dokumenty związane	str 2
5. Załączniki	str 2
6. Spis treści, Karta zmian, Zatwierdzenia	str 3

Karta zmian

Nr zmiany	Zmiany		Opis zmiany	Data zmiany	Podpis autora zmiany
	Punktu Podpunktu rozdziału	Akapitu lub fragmentu tekstu ze strony nr			
1.	Całość	Całość	Przegląd aktualizacyjny	10.02.2013	Jacek Wałek
2	2.2.1	1	Nowa treść.	08.05.2015	T. Lubszczyk
3.	2.2.1	1	Nowa treść.	26.06.2015	W. Kącik
4.	2.2.2	1 i 2	Zmiana treści w punkcie 2.2.2 a	07.03.2017	J. Wałek
5	Całość	Całość	Zmiana szaty graficznej – wydanie 5	01.10.2018	Beata Mros-Jaszewska

Zatwierdzenia

Zespół	Imię i nazwisko KO	Data	Podpis
Opracował	DOt Jacek Wałek	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	DOZ Teresa Lubszczyk	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	NEp Beata Mros-Jaszewska	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdziła	NEp Barbara Matuszek	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sprawdził	PZJ Grzegorz Bula	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>
Zatwierdziła	DM Elżbieta Wielgos-Karpińska	01.10.2018	<i>Podpis nieczytelny</i>